



Svarīga informācija pacientam par zāļu riska mazināšanu
Zāļu EYLEA (aflibercepta šķīdums injekcijai) riska mazināšanai pirms ārstēšanas
uzsākšanas un ārstēšanas laikā

JŪSU CEĻVEDIS PAR EYLEA®

(aflibercepta šķīdums injekcijai)

EYLEA tiek lietots:

- neovaskulāras (eksudatīvas jeb mitrās) senilās (vecuma) makulas deģenerācijas (SMD) ārstēšanai,
- redzes traucējumu makulas tūskas dēļ pēc tīklenes vēnas oklūzijas (tīklenes vēnas zara oklūzijas (TVZO) vai tīklenes centrālās vēnas oklūzijas (TCVO)) ārstēšanai,
- redzes traucējumu diabētiskās makulas tūskas dēļ (DMT) ārstēšanā.
- ar miopiju saistītas dzīslenes neovaskularizācijas (miopiskās DNV) izraisītu redzes traucējumu ārstēšanai.

Versija 6.0 (01/2020)

L ŪDZAM

iepazīties ar EYLEA® ceļvedi!

Jūsu ārsts ir nozīmējis EYLEA, jo Jums ir diagnosticēti redzes traucējumi sakarā ar neovaskulāru (eksudatīvu jeb mitru) senilo (vecuma) makulas deģenerāciju (SMD), makulas tūsku pēc tīklenes vēnas oklūzijas (tīklenes vēnas zara oklūzijas (TVZO) vai tīklenes centrālās vēnas oklūzijas (TCVO)), redzes traucējumiem diabētiskās makulas tūskas dēļ (DMT), redzes traucējumiem ar miopiju saistītas dzīslenes neovaskularizācijas dēļ (miopisko DNV).

Tas ir stāvoklis, kad Jūsu redze ir pasliktinājusies. EYLEA terapija var palīdzēt Jūsu redzei nekļūt sliktākai un var uzlabot dažus slimības simptomus.

Jūsu ārsts Jums izsniegs karti ar pieejas/QR kodu interneta vietnei, kurā būs Eylea ceļvedis. Šajā ceļvedī ir iekļauts arī audio ieraksts, kurā ir ierakstīta visa tā pati informācija, kas ceļvedī.

Informācija, ko Jūs iegūsiet vai nu lasot ceļvedi, vai klausoties audio ierakstu, var palīdzēt iegūt atbildes uz jautājumiem, kas var rasties ārstēšanas laikā.

Jūsu acu klīnika ir:

Kontaktpersonas
vārds, uzvārds: _____

Tālrunis: _____

Adrese: _____

E:pasts: _____

Šajā ceļvedī Jūs atradīsiet:

Ko var gaidīt, ārstējoties ar EYLEA

- Kas ir EYLEA?
- Kā jālieto EYLEA?
- Kas jādara, ja man ir jautājumi par Eylea?

Kā rūpēties par acīm pēc ārstēšanas ar EYLEA

- Ko es varu sagaidīt?
- Kad man būs atkārtoti jāsaņem EYLEA?
- Vai EYLEA ir blakusparādības?

Ceļvedī ir arī noderīga informācija par atbalstu, kādu varat saņemt SMD, TVZO, TCVO, DMT un miopiskās DNV gadījumā, kā arī kalendārs, kurā Jūs varat atzīmēt EYLEA terapijas un vizīšu datumus.

KAS IR EYLEA® ?

EYLEA ir ārstēšanas veids, kas zināms kā anti-VEGF. Šis saīsinājums nozīmē pret-asinsvadu endotēlija augšanas faktors, kura nosaukums parāda kā EYLEA darbojas, lai pasargātu Jūsu redzi. EYLEA bloķē noteiktas olbaltumvielas, kas nepieciešamas jaunu asinsvadu attīstībai Jūsu acī. Bloķējot sākotnēji šīs antivielas EYLEA var palīdzēt saglabāt vājus asinsvadus, savukārt tas var uzlabot Jūsu redzi.

EYLEA ir šķīdums, ko injicē acī.

Ir pilnīgi saprotami, ka esat noraizējies par injekciju acī, tomēr iespējams, ka šī injekcija neizraisīs sāpes un nebūs tik nepatīkama, kā domāts.

KĀDIEM

pacientiem ir paredzēta EYLEA® ?

EYLEA paredzēta pacientiem, kuriem ir diagnosticēta SMD, TVZO, TCVO, DMT vai miopiskā DNV.

Pirms EYLEA terapijas uzsākšanas pārlicinieties, ka esat pastāstījis ārstam vai māšai, ja:

- Jums ir infekcija acī vai ap to,
- Jums šobrīd ir apsārtums vai sāpes acī,
- ir aizdomas, ka varētu būt alerģija pret jodu, pretsāpju līdzekļiem vai kādu no EYLEA sastāvdaļām,
- Jums iepriekš ir bijušas problēmas ar acs injekcijām,
- Jums ir glaukoma vai kādreiz ir bijusi acs spiediena paaugstināšanās,
- Jūs kādreiz esat redzējis gaismas uzliesmojumus vai peldošas „mušīņas”,
- Jūs lietojat vai esat lietojis pēdējā laikā jebkādas citas zāles, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes,

- esat grūtniece, plānojat grūtniecību vai barojat bērnu ar krūti. Nav pieredzes EYLEA lietošanā grūtniecēm. EYLEA nedrīkst lietot grūtniecības laikā, pirms ārstēšanas ar EYLEA izrunājiet to ar savu ārstu. Sievietēm reproduktīvā vecumā ārstēšanās laikā un vismaz 3 mēnešus pēc pēdējās injekcijas jālieto efektīva kontracepcijas metode,
- Jums bija vai būs ķirurģiska iejaukšanās acīs 4 nedēļas pirms vai pēc EYLEA terapijas.

K **Ā** man ir jāsaprotas **EYLEA**[®] injekcijai?

Jūsu ārsts var jums ieteikt lietot acu pilienus dažas dienas pirms vizītes. Pēc ārstēšanas Jūsu redze var būt neskaidra un tāpēc, atgriežoties mājās, Jums nevajadzētu vadīt automašīnu. Palūdziet draugam vai ģimenes loceklim Jūs nogādāt mājās vai organizējiet kādu citu veidu, kā nokļūt mājās. Vizītes dienā nelietojiet kosmētiskos līdzekļus.

K AS

NOTIKS EYLEA® injekcijas laikā?

Jūsu ārsts vai māsa sagatavos Jūs ārstēšanai ar EYLEA. Šie cilvēki ir kvalificēti un apmācīti profesionāļi ar pieredzi SMD, TVZO, TCVO, DMT un miopiskās DNV ārstēšanā.

Jūs saņemsiet acu pilienus, kas darbosies kā lokāls pretsāpju līdzeklis, un acs skalošanas līdzekli, lai notīrītu Jūsu aci un apkārtējo ādu. Jūsu seju pārklās ar speciālu paladziņu un Jūsu aci paturēs atvērtu. Lokālais pretsāpju līdzeklis aizmiglos Jūsu redzi, tāpēc Jūs neredzēsiet adatu.

Pieredzējis ārsts Jums izdarīs injekciju Jūsu acs baltumā. Galvenokārt pacienti saka, ka injekcija ir nesāpīga, bet dažī var sajust vieglu spiedienu. Visa procedūra var likties mazliet nepatīkama, bet tās ilgums ir tikai dažas minūtes.

Ja man ir neskaidrības vai jautājumi?

Ja Jums ir neskaidrības vai jautājumi, Jūsu ārsts vai māsa ir īstie cilvēki, ar kuriem to izrunāt. Viņi ir ļoti pieredzējuši un informēti par Jūsu veselības stāvokli, tāpēc varēs sniegt atbildes, kas Jums nepieciešamas.

Neuztraucieties, ja neskaidrību gadījumā Jums ir jāuzdod jautājumi. Jūsu ārsts vai māsa sniegs Jums atbildes.

Kas notiks pēc EYLEA® ievadīšanas?

Pēc injekcijas Jūsu ārsts var veikt dažus acu testus. Tas var iekļaut gaisa iepūšanu, ar kura palīdzību varēs izmērīt spiedienu Jūsu acī. Tūlīt pēc terapijas Jūsu redze būs neskaidra. Ja Jums jāvada transportlīdzeklis, to vajadzētu darīt tikai pēc tam, kad Jūsu redze ir atkal normāla.

Nākamajās pāris dienās Jums var rasties ar asinīm pieplūdusi acs vai parādīties kustīgi plankumi redzes laukā. Ja šie abi simptomi neizzūd dažu dienu laikā vai pasliktinās, Jums jāsaazinās ar savu ārstu.

Pēc injekcijas daži cilvēki var just nelielas sāpes vai diskomfortu acī. Ja tas neizzūd vai pasliktinās, Jums jāsaazinās ar savu ārstu.

K_{AD}

man būs nepieciešama nākamā vizīte?

Jūsu ārsts noteiks, kad Jums būs nepieciešama nākamā vizīte. Jūsu ārstēšanas grafiks tiks veidots, lai vislabāk varētu ievērot Jūsu individuālās vajadzības.

Vienmēr atcerieties, ka, ja Jums ir jautājumi par ārstēšanu, Jūsu ārsts vai māsa ir vispiemērotākie cilvēki, kas varēs uz tiem atbildēt.

Pirms EYLEA terapijas pārtraukšanas konsultējieties ar ārstu.

Kad Jums ir nozīmēta jauna vizīte, neaizmirstiet to ierakstīt kā atgādinājumu uz ceļveža aizmugurējā vāka.

VAI EYLEA®

ir blakusparādības?

Tāpat kā visas recepšu un bezrecepšu zāles, EYLEA var izraisīt blakusparādības. Ne visiem pacientiem, kuri saņem EYLEA terapiju, novēro blakusparādības.

Visbiežāk novērotās blakusparādības ir:

- asinīm pieplūdusi acs, ko izraisa asinsizplūdums no mazajiem asinsvadiem acs ārējā slānī (asinsizplūdums konjunktīvā),
- sāpes acī,
- gelam līdzīgas vielas atslāņošanās no tīklenes acs iekšpusē (stiklveida ķermeņa atslāņošanās),
- lēcas apduļķošanās (katarakta),
- kustīgi plankumi redzes laukā (stiklveida ķermeņa apduļķojumi),
- acs iekšējā spiediena paaugstināšanās.

Dažas no tām var kļūt nopietnas, piemēram:

- infekcija acs iekšpusē,
- lēcas apduļķošanās (katarakta).

Sazinieties ar ārstu pēc iespējas ātrāk, ja pastiprinās sāpes acī, apsārtums kļūst izteiktāks, Jūsu redze kļūst neskaidra vai Jūs nevarat redzēt pietiekami labi, vai Jums parādās paaugstināta jutība pret gaismu.

Pilns blakusparādību saraksts ir atrodams lietošanas instrukcijā, kas pievienota pacienta ceļvedim.

Ja Jūs domājat, ka ārstēšana Jums ir izraisījusi blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu.

Aicinājums sniegt ziņojumus

Jūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) elektroniski interneta vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes "Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci" un izvēloties "Ziņo par zāļu blaknēm", un "Pacienta ziņojuma e-veidlapa". Tālrunis informācijai: 67078400.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA Bayer nacionālo kontaktpersonu farmakovigilances jautājumos, tālrunis 67895957.

Ziņot par blakusparādību varat arī vietnē <http://www.edumaterial.bayer.lv> kur varat arī iegūt papildu informāciju par Eylea, izmantojot pieejas kodu kartes, kuras Jums izsniedza Jūsu ārstējošais ārsts.